

Lesiones Elementales Primarias y Secundarias

A)- Lesiones primarias: son lesiones que aparecen sin lesiones previas:

Mácula: área plana de la piel de color diferente de la piel normal, suele describirse con un adjetivo que califica el color: eritematosa, pigmentada, purpúrica.

Pápula: lesión circunscrita, elevada y sólida de tamaño inferior a 1 cm.

Nódulo: lesión elevada, sólida de tamaño mayor de 1 cm, cuando la lesión tiene carácter inflamatorio puede utilizarse el término de tubérculo

Tumor: Lesión sólida, sobreelevada de mayor tamaño con tendencia a persistir

Vesícula: lesión elevada llena de líquido de menos de 1 cm

Ampolla: lesión elevada, llena de líquido de más de 1 cm

Pústula: lesión elevada llena de pus de menos de 1 cm

Habón: elevación circunscrita de la piel, de forma y dimensiones variables, edematosa y de evolución fugaz con pocas horas de duración.

Otras lesiones primarias

Placa: lesión elevada de la piel de más de 2 centímetros de diámetro formada por la coalescencia de varias pápulas o nódulos.

Quiste: Cavidad cerrada, con revestimiento interior epitelial, endotelial o fibroso, conteniendo líquidos o semisólidos.

Absceso: colección localizada de pus en una cavidad (de más de 1 cm)

Petequia: extravasación de sangre en la piel

Equimosis: extravasación de sangre en la piel de mayor tamaño

Púrpura: presencia de sangre en la piel de hasta 2 mm, que puede ser palpable.

Angioedema: Edema difuso de la dermis y tejido subcutáneo

Comedones: presencia de un tapón de queratina y restos sebáceos en el folículo pilo-sebáceo

Surco: Línea más o menos tortuosa, algo sobreelevada, de color variable, producido por el ácaro de la sarna.

Telangiectasia: dilatación visible de vasos cutáneos de pequeño tamaño.

Poiquilodermia: combinación de atrofia, hiperpigmentación reticulada y telangiectasias

Esclerosis: induración de los tejidos subcutáneos

Infarto: área de necrosis cutánea por oclusión de los vasos

Gangrena: muerte tisular, generalmente debida a la pérdida del riego sanguínea

Cuando se describen las lesiones elementales primarias, los términos pueden ser combinados.

B) Lesiones secundarias: son las lesiones que aparecen a partir de alguna alteración patológica de la piel y son:

Costra: Concreciones de serosidad, pus, sangre y detritus dermo-epidérmicos o sus combinaciones.

Escamas: lesiones secas derivadas del estrato córneo, ocurren en patologías secas con aumento de la producción de queratina

Excoriaciones: erosión producida por el rascado, suele ser lineal e indican un proceso prurítico

Erosión o úlcera: situaciones en las que se pierde la superficie cutánea. Las erosiones son superficiales y las úlceras más profundas

Cicatrices: marcas permanentes derivadas de un daño dérmico, pueden ser atróficas, hipertróficas o queloideas

Fisuras: grietas cutáneas que aparecen sobre piel seca y en afectaciones cutáneas crónicas

Atrofia: pérdida del espesor y consistencias normales de la piel.

Esclerosis: áreas de endurecimiento de la piel, debido a daño dérmico

Liquenificación: expresión clínica del engrosamiento de la piel, se caracteriza clínicamente por la prominencia de las estrías o surcos que normalmente la cubren.

Infiltración: Aumento de espesor de la piel, con participación de la dermis y, a veces, de tejidos más profundos, producida por inflamación o por neoformaciones tumorales.

Goma: nódulo que se reblandece y ulcera, evolucionando sucesivamente por los estadios de crudeza, reblandecimiento, ulceración y reparación.

Cuando se describen las lesiones se pueden combinar términos de las lesiones primarias y secundarias.

Bibliografía:

<https://www.uv.es/derma/CLindex/CLsemiologia/CLsemiologia.html>